

## Schema theorie matrixfuncties

**Citation for published version (APA):**

Bruijn, de, N. G. (1955). *Schema theorie matrixfuncties*. Stichting Mathematisch Centrum.

**Document status and date:**

Gepubliceerd: 01/01/1955

**Document Version:**

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

**Please check the document version of this publication:**

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

**General rights**

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.tue.nl/taverne](http://www.tue.nl/taverne)

**Take down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[openaccess@tue.nl](mailto:openaccess@tue.nl)

providing details and we will investigate your claim.

Schema Theorie Matrixfuncties

door

N.G. de Bruijn.

- Def. 1.  $MR_n$  = ruimte van alle complexe  $n \times n$  matrices. Gebruikelijke topologie.  
 $MR_n^*$  = verz. der niet-singuliere matrices uit  $MR_n$ .
- Def. 2.  $A \in MR_n$  heet diagonaal (notatie  $A = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ ) als in de hoofd-diagonaal  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  staan, en daerbuiten nullen. De eenheidsmatrix is aangeduid door  $I$ .
- Def. 3.  $A$  heet triangulair als onder de hoofddiagonaal slechts nullen staan.  
 $A$  heet supertriangulair als ook de hoofddiagonaal nul is.
- Def. 4. Als  $\nu_1 + \dots + \nu_s = n$  een partitie van  $n$  is, dan zeggen wij dat  $A$  het type  $(\nu_1, \dots, \nu_s)$  heeft, wanneer  $A$   $s$  verschillende eigenwaarden heeft, resp. met multipliciteiten  $\nu_1, \dots, \nu_s$ . In het symbool  $(\nu_1, \dots, \nu_s)$  is de volgorde der  $\nu$ 's irrelevant.  
 Zijn  $\alpha$  en  $\beta$  typen, dan heet  $\alpha < \beta$  als  $\alpha$  uit  $\beta$  ontstaat door hier en daar  $\nu$ 's samen te nemen: b.v.  $(2, 2, 3) < (2, 1, 1, 1, 2)$ .  
 Wij gebruiken ook het symbool  $\leq$
- Def. 5.  $A$  heet niet-critiek, als  $A$  het type  $(1, 1, \dots, 1)$  heeft (d.w.z. alle eigenwaarden verschillend). In alle andere gevallen heet  $A$  critiek.
- Def. 6. Is  $A \in MR_n$ ,  $X \in MR_n^*$ , dan is  $A^X$  gedefinieerd door  $X^{-1}AX$ . Dus  $(A^X)^Y = A^{XY}$ .
- St. 1. Is  $A$  niet-critiek, dan volgt uit  $A^X = A^Y$ , dat  $X = DY$ , waarin  $D$  diagonaal en niet-singulier is, en omgekeerd. Is  $A$  critiek dan zijn er niet-diagonale matrices  $X$  met  $A^X = A$ .
- Def. 7. Zij  $G$  een gebied in  $MR_n$ .  $A_1 \in G$  en  $A_2 \in G$  heten geconjugueerd in  $G$ , als er een continue afb. van  $[0, 1]$  in  $MR_n^*$  bestaat (aangeduid door  $X(t)$ ), zó dat  

$$A_1^{X(t)} \in G \quad (0 \leq t \leq 1), \quad A_1^{X(0)} = A_1, \quad A_1^{X(1)} = A_2.$$
- Def. 8. Een polynoom is een functie van de matrixvariabele  $Z$ , gegeven door een formule van de vorm:  

$$P(Z) = c_0 I + c_1 Z + \dots + c_N Z^N,$$
 waarin de  $c$ 's scalair en constant zijn.

Def. 9. Zij  $G$  een gebied in  $MR_n$ ,  $F$  een matrixfunctie op  $G$  (d.i. een afb. van  $G$  in  $MR_n$ ).  $F$  heet sterk analytisch in  $G$ , als er een rij polynomen  $\{P_k(Z)\}$  is die in elk compact deel van  $G$  uniform naar  $F$  convergeert.

Def. 10.  $F$  heet analytisch in  $G$ , als er bij elk punt van  $G$  een omgeving is waarin  $F$  sterk analytisch is.  $F$  heet analytisch in  $A$ , als  $F$  analytisch is in een omgeving van  $A$ .

St. 2.  $G$  en  $H$  gebieden van  $MR_n$ .  $F_1$  en  $F_2$  analytisch in  $G$  resp.  $H$ . Verder wordt  $G$  door  $F_1$  in  $H$  afgebeeld. Dan is  $F_2(F_1(Z))$  analytisch in  $G$ .

St. 3.  $A_1$  en  $A_2$  geconjugueerd in  $G$ ,  $X(t)$  de functie uit def. 7.  $F$  analytisch in  $G$ . Dan is

$$F(A_2) = F(A_1)^{X(1)}.$$

St. 4.  $P(Z)$  polynoom, dan  $P(A) = \frac{1}{2\pi i} \int \frac{P(\lambda)}{\lambda I - A} d\lambda$ ,

waarbij in positieve zin om alle eigenwaarden van  $A$  heen wordt geïntegreerd.

St. 5.  $n$  eigenwaarden  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  met multipliciteiten  $\nu_1, \dots, \nu_s$ . Zij  $F$  analytisch in  $A$ . Dan is er een open verzameling  $S$  in het complexe vlak, die  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  bevat, en daarin een analytische functie  $f$ , zodanig dat voor alle  $Z$  in een zekere omgeving van  $A$  geldt

$$(1) \quad F(Z) = \sum_{j=1}^s \frac{1}{2\pi i} \int_{W_j} \frac{f(\lambda)}{\lambda I - Z} d\lambda \quad (W_j = \text{kring om } \lambda_j).$$

De functie  $f(\lambda)$  is in zekere omgevingen van  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  eenduidig bepaald. Is  $P_k(Z) \approx F(Z)$  in een omgeving van  $A$ , dan is ook  $P_k(\lambda) \approx f(\lambda)$  in zekere omgevingen van  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ .

Is  $Z$  voldoende dicht bij  $A$ , en is

$$Z = ([\zeta_1, \dots, \zeta_s] + K)^X \quad (K \text{ superdiagonaal}),$$

dan is

$$F(Z) = ([f(\zeta_1), \dots, f(\zeta_s)] + K_1)^X \quad (K_1 \text{ superdiagonaal}).$$

Opm.:  $f$  is analytisch in elk deelgebied van  $S$ , doch deze verschillende functietakken behoeven niet analytisch samen te hangen.

St. 6.  $\frac{1}{\lambda_0 I - Z}$  is een analytische functie van  $Z$  voor alle  $Z$  waarvan  $\lambda_0$  geen eigenwaarde is.

St. 7.  $G_1, \dots, G_s$  disjuncte gebieden in complexe vlak.  $f(\lambda)$  analytisch in elk dezer  $G_j$ 's. Laat  $\mathcal{K} (G_1^{v_1}, \dots, G_s^{v_s})$  de collectie zijn van alle matrices die  $v_j$  eigenwaarden in  $G_j$  hebben ( $j = 1, \dots, s$ ). Definieer de functie  $F(Z)$  in  $\mathcal{K}$  door (1) (st. 5; voor elke  $j$  loopt  $v_j$  nu in  $G_j$  om de in  $G_j$  gelegen eigenwaarden van  $Z$ ). Dan is  $F(Z)$  analytisch in  $\mathcal{K}$ .

Is  $A \in \mathcal{K}$ , en  $A = ([\alpha_1, \dots, \alpha_n] + N)^X$ , waarin  $N$  nilpotent is en verwisselbaar met  $[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ , dan is

$$F(A) = \sum_{j=0}^{n-1} [f^{(j)}(\alpha_1), \dots, f^{(j)}(\alpha_n)] N^j / j!$$

St. 8. Is  $F(Z)$  analytisch in een gebied, dan is daar

$$F(Z) = c_0(Z)I + c_1(Z)Z + \dots + c_{n-1}(Z)Z^{n-1},$$

waarin de  $c_j$ 's niet-constante scalaires zijn.

Het type van  $F(Z)$  is  $\leq$  het type van  $Z$ .

Def. 11. Block in  $MR_n$ . Laat gegeven zijn  $n$  disjuncte gebieden  $G_1, \dots, G_n$  in complexe vlak, en een samenhangend deel  $C$  van  $MR_n^*$ . Dan heet de verzameling  $\mathcal{B} (G_1, \dots, G_n; C)$ , bestaande uit alle

$$[\lambda_1, \dots, \lambda_n]^X \quad (\lambda_1 \in G_1, \dots, \lambda_n \in G_n, X \in C)$$

een block. De open verzameling  $S(\mathcal{B}) = G_1 + \dots + G_n$  heet het spectrum van het block.

St. 9. Is het block  $\mathcal{B}$  gegeven, dan is  $S(\mathcal{B})$  eenduidig bepaald. Bij elke rangschikking  $G_1, \dots, G_n$  van de samenhangende componenten van  $S(\mathcal{B})$  is een  $C$  te vinden, zó dat  $\mathcal{B} = \mathcal{B}(G_1, \dots, G_n, C)$ . Bij elke  $A \in \mathcal{B}$  is dan de  $X$  vastgelegd op een diagonale linksfactor na (st. 1); deze kan, daar  $C$  samenhangend moet zijn, echter niet overal willekeurig gekozen worden.

St. 10. Elk block is een gebied in  $MR_n$ .

St. 11.  $A \in MR_n$ ,  $O$  omgeving van  $A$ ,  $A$  niet-critiek. Dan is er een block  $\mathcal{B}$  met  $A \in \mathcal{B} \subset O$ .

St. 12. Zijn  $\mathcal{B}_1$  en  $\mathcal{B}_2$  blocks, en ligt  $A$  in hun doorsnede, dan bevat die doorsnede ook een block dat  $A$  bevat (de doorsnede behoeft zelf geen block te zijn).

St. 13. Laat  $\mathcal{B}$  een block zijn in  $MR_n$ , en laat  $F$  analytisch zijn in  $\mathcal{B}$ . Dan is er een in  $S(\mathcal{B})$  eenduidig bepaalde analytische functie  $f$  zó dat voor elke  $A \in \mathcal{B}$  geldt, dat bij elke representatie

$$A = [\lambda_1, \dots, \lambda_n]^X$$

geldt  $F(A) = [f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)]^X$ .

$F$  en  $f$  bepalen elkaar eenduidig.

St. 14. Laat  $F$  het blok  $\mathcal{B}$  uit  $MR_n$  éénéénduidig afbeelden op de verzameling  $\mathcal{B}'$  van  $MR_n$ . Dan is  $\mathcal{B}$  een blok (uit  $2^e$  deel van st. 1 volgt dat  $\mathcal{B}$  geen critieke punten bevat); de inverse afbeelding  $F_1$  is analytisch in  $\mathcal{B}'$ . De volgens st. 13 bij  $F$  behorende functie  $f$  beeldt  $S(\mathcal{B})$  conform af op  $S(\mathcal{B}')$ . De bij  $F_1$  behorende functie  $f_1$  is de inverse van  $f$ .

Def. 12. Een analytic matrix manifold (MM) is een samenhangende Hausdorff-ruimte  $M$  met een klasse van gelijkwaardige systemen van uniformiserende parameters. Een uniformiserende parameter is een topologische afbeelding van een gebied van  $M$  op een gebied van  $MR_n$ . Een systeem van uniformiserende parameters is een dusdanige collectie, dat  $1^e$  elk punt van  $M$  in het definitiegebied van minstens één uniformiserende parameter ligt, en  $2^e$  zijn de uniformiserende parameters  $\varphi$  en  $\psi$  beide in  $P$  gedefinieerd, dan is er een in een omgeving van  $\varphi(P)$  gedefinieerde analytische functie  $F$  zó dat  $F(\varphi(Q)) = \psi(Q)$  voor alle  $Q$  in een omgeving van  $P$ . Twee systemen heten gelijkwaardig als ze samen weer een systeem vormen.

Een in een gebied  $G$  van  $M$  gedefinieerde afbeelding  $F$  van  $G$  in  $MR_n$  heet analytisch als er bij elke  $P \in G$  een uniformiserende parameter  $\varphi$  is, gedefinieerd in een omgeving van  $P$  en gekozen uit één der gegeven systemen, zó dat in een omgeving van  $Q$   $F(Q)$  een analytische functie van  $\varphi(Q)$  is.

St. 15. Zij  $\Sigma$  een verzameling. Bij elke  $\sigma \in \Sigma$  zij gegeven een gebied  $G_\sigma$  uit  $MR_n$ . In de collectie van alle paren  $(G_\sigma, A)$  ( $\sigma \in \Sigma, A \in G_\sigma$ ) zij een equivalentierelatie gegeven, die voldoet aan de volgende eigenschappen:

1. reflexief, symmetrisch, transitief.

2. Is  $(G_\sigma, A) \sim (G_\tau, A_1)$ , dan is er een omgeving  $O$  ( $A \in O \subset G_\sigma$ ) en daarop een analytische functie  $F$ , zó dat voor alle  $B \in O$  geldt  $(G_\sigma, B) \sim (G_\tau, F(B))$ , terwijl  $F(A) = A_1$ .

3. Uit  $(G_\sigma, A) \sim (G_\sigma, B)$  volgt  $A = B$ .

4a. Is  $(G_\sigma, A)$  niet equivalent met  $(G_\tau, A_1)$ , dan zijn er omgevingen  $O$  en  $O_1$  ( $A \in O \subset G_\sigma, A_1 \in O_1 \subset G_\tau$ ) zo dat voor alle  $B \in O, B_1 \in O_1$  geldt dat  $(G_\sigma, B)$  en  $(G_\tau, B_1)$  niet equivalent zijn.

4b. (gelijkwaardig met 4a) Is  $\sigma \in \Sigma, \tau \in \Sigma$ , en is een rij  $A, A_1, A_2, \dots$  van punten uit  $G_\sigma$  gegeven en een rij  $B, B_1, B_2, \dots$  uit  $G_\tau$ , zó dat  $(G_\sigma, A_k) \sim (G_\tau, B_k)$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) en is  $A_k \rightarrow A, B_k \rightarrow B$ , dan is ook  $(G_\sigma, A) \sim (G_\tau, B)$ .

5. Zijn  $(G_\sigma, A)$  en  $(G_\tau, B)$  paren uit de collectie, dan zijn er rijen  $\sigma = \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m = \tau$  (alle uit  $\Sigma$ ),  $A = A_0, A_1, \dots, A_m$  ( $A_j \in G_{\sigma_j}$ ),  $B_0, \dots, B_m = B$  ( $B_j \in G_{\sigma_j}$ ) met  $(G_{\sigma_{j-1}}, B_{j-1}) \sim (G_{\sigma_j}, A_j)$  ( $j = 1, \dots, m$ ).

Laat  $M$  de collectie zijn van alle klassen van equivalente paren. Een deel  $M_1$  van  $M$  heet open als er bij elk punt van  $M_1$  een paar  $(G_\sigma, A)$  uit de door dat punt aangewezen klasse is te vinden, zó dat er een omgeving  $O$  ( $A \in O \subset G_\sigma$ ) bestaat met de eigenschap dat alle klassen  $(G_\sigma, B)$  ( $B \in O$ ) eveneens tot  $M$  behoren. Kies als een systeem van uniformiserende parameters de afbeeldingen  $\varphi_\sigma (\sigma \in \Sigma)$ , gedefinieerd door

$$\varphi_\sigma \{(G_\sigma, A)\} = A \quad (A \in G_\sigma).$$

Bewering:  $M$  is, met het hier aangegeven systeem, een analytisch manifold.

St.16. Is  $G$  een gebied in  $MR_n$ , dan is het slechts uit de identieke afbeelding bestaande systeem een systeem van uniformiserende parameters, en  $G$  is daarbij een MM.

Def.13. Zijn  $M$  en  $M_1$  beide MM's, en is er een éénéénduidige afbeelding zó dat elke uniformiserende parameter op  $M$  analytisch is op  $M_1$  en elke uniformiserende parameter op  $M_1$  analytisch is op  $M$ , dan heten  $M$  en  $M_1$  isomorph.

Def.14. Een afbeelding van  $M$  in  $M_1$  heet homeomorph, als elke uniformiserende parameter van  $M_1$  een analytische functie op  $M$  is.

Opmerking. Het is niet noodzakelijk, dat hierbij open verzamelingen in open verzamelingen overgaan. Voorbeeld:  $M=M_1=MR_n$ ,  $F(A)=A^2-A$ . De matrices  $\begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  treden voor geen enkele  $a$  als beeld op.

St.17. Is  $M$  een MM, en  $P \in M$ ,  $\varphi$  en  $\psi$  uniformiserende parameters in  $P$ , dan hebben  $\varphi(P)$  en  $\psi(P)$  hetzelfde type (St.8). Is  $\varphi(P)$  diagonaal resp. triangulair, symmetrisch, dan  $\psi(P)$  ook.

Def.15. Type van een punt  $P$  van  $M =$  type van  $\varphi(P)$ .  $P$  heet kritiek resp. diagonaal, triangulair, symmetrisch, als  $\varphi(P)$  dat is.

St.18. De verzameling der niet-critieke punten van een MM is open en overall dicht.

Def.16. Een samenhangend deel  $\mathcal{F}$  van een MM heet een fiber, als er bij elke  $P \in \mathcal{F}$  een omgeving  $O$  van  $P$  is met daarop een uniformiserende parameter  $\varphi$ , zó dat  $Q_1 \in (\mathcal{F} \cap O)$ ,  $Q_2 \in (\mathcal{F} \cap O) \Rightarrow \varphi(Q_1)$  en  $\varphi(Q_2)$  geconjugeerd in  $\varphi(\mathcal{F})$ .

De definitie is onafhankelijk van de keuze van  $\varphi$  (zie St.3).

Def.17. Een verzameling  $\mathcal{B} \subset M$  heet een block als er een analytische functie op  $\mathcal{B}$  is, die  $\mathcal{B}$  éénéénduidig op een block van  $MR_n$  afbeeldt.

St.19. Block op  $M$  bevat geen critieke punten. Elk niet-critiek punt is bevat in een block. Hebben de blocks  $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$  een punt  $P$  ge-

meen, dan is er een block  $\mathcal{B} \ni P$  dat in de doorsnede ligt. Is een block  $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$  éénéénduidig analytisch afgebeeld op een block  $\mathcal{B}'$  van  $MR_n$ , dan is elk deelblok van  $\mathcal{B}'$  het beeld van een deelblok van  $\mathcal{B}$ .

St.20. Zijn P en Q niet critieke punten in een gebied G van M, dan is er een continue kromme van P naar Q, die in G verloopt en geen critieke punten bevat.

Def.18.  $M^-$  is datgene wat uit M ontstaat door de critieke punten weg te nemen, en de uniformiserende parameters tot de niet-critieke punten te beperken.

St.21.  $M^-$  is een samenhangend open deel van M, en dus weer een MM.

Def.19. Spectral manifold van  $M^-$ .

Zij  $\Sigma$  een verzameling; kies bij elke  $\sigma \in \Sigma$  een block  $\mathcal{B}_\sigma$  uit  $M^-$ , zó dat  $M^-$  door deze blocks geheel wordt overdekt. Verder kiezen we bij elke  $\mathcal{B}_\sigma$  een éénéénduidige afbeelding  $\varphi_\sigma$  van  $\mathcal{B}_\sigma$  op een block  $\mathcal{B}'_\sigma$  van  $MR_n$ .  $S(\mathcal{B}'_\sigma)$ , het spectrum van  $\mathcal{B}'_\sigma$ , korten we af tot  $V_\sigma$ .

Beschouw de collectie van alle paren  $(V_\sigma, z) (\sigma \in \Sigma, z \in V_\sigma)$ .

Definieer equivalentie

$$(V_\sigma, z) \sim (V_\tau, w),$$

zodra er een punt  $P \in M$  is met  $P \in \mathcal{B}_\sigma, P \in \mathcal{B}_\tau, z$  en  $w$  eigenwaarden van  $\varphi_\sigma(P)$  resp.  $\varphi_\tau(P)$ , terwijl  $w=f(z)$ . Hierbij is  $f$  de functie die volgens St.5 (of St.13) met  $F$  correspondeert, een  $F$  is de in een omgeving van  $\varphi_\sigma(P)$  analytische functie die voldoet aan  $F(\varphi_\sigma(Q)) = \varphi_\tau(Q)$  ( $Q$  in omgeving van  $P$ ).

Noem nu een klasse van equivalente paren een punt van SM, definieer omgevingen en uniformiserende parameters als in St.15 (pas St.15 toe met  $n=1$ ). Zo ontstaat een analytic manifold, i.h.a. niet samenhangend (aan de 5e eis van St.15 is niet steeds voldaan).

St.22. SM is onafhankelijk van de keuze der  $\mathcal{B}_\sigma$ 's en der  $\varphi_\sigma$ 's.

Def.20. Bij elke  $P \in M^-$  behoort een verzameling van  $n$  punten van SM ( $n$ .l. de klassen gerepresenteerd door  $(V_\sigma, z_j)$ , waarin  $z_1, \dots, z_n$  de eigenwaarden van  $\varphi_\sigma(P)$  zijn). Deze  $n$  punten vormen het z.g. spectrum van P.

St.23. Er zijn getallen  $\nu_1, \dots, \nu_s$  ( $\nu_1 + \dots + \nu_s = n$ ) met de volgende eigenschap: SM bestaat uit  $s$  samenhangende delen  $S_1, \dots, S_s$ . Voor elke  $P \in M^-$  bestaat het spectrum uit  $\nu_1$  punten van  $S_1, \nu_2$  punten van  $S_2, \dots$ .

Def.21. Zijn  $u_1, \dots, u_n$  onbepaalden, is  $\pi(1), \dots, \pi(n)$  een permutatie van  $1, \dots, n$ , en is  $X \in MR_n^*$ , dan heet  $[u_{\pi(1)}, \dots, u_{\pi(n)}]^X$  een normaalvormsymbool.

Twee met dezelfde u's gevormde symbolen heten equivalent:

$$[u_{\pi(1)}, \dots, u_{\pi(n)}]^X \sim [u_{\varphi(1)}, \dots, u_{\varphi(n)}]^Y$$

als  $XY^{-1} = DR$ , waarin D diagonaal is en R de permutatiematrix gedefinieerd door  $r_{ij} = \delta_{i, \sigma(j)}$ , waar  $\sigma = \pi^{-1} \varphi$ . M.a.w., als in het geval dat de u's verschillende complexe getallen zijn, de hierboven aangeduide matrices identiek zijn.

Def.22. Is  $P \in M^-$ ,  $\sigma \in \Sigma$  (zie Def.19),  $z_1, \dots, z_n$  een rangschikking van het spectrum van  $\varphi_{\sigma}(P)$ , en zijn  $P_1, \dots, P_n$  de respectievelijk door  $(V_{\sigma}, z_1), \dots, (V_{\sigma}, z_n)$  gerepresenteerde punten van  $M^-$ , en is  $\varphi_{\sigma}(P) = [z_1, \dots, z_n]^X$ , dan heet  $[P_1, \dots, P_n]^X$  een normaalvorm van P.

St.24. Alle normaalvormen van P zijn onderling equivalent.

St.25. Is F analytisch op de gehele  $M^-$ , dan is er een analytische functie f op de SM van  $M^-$ , zó dat voor elk punt P van  $M^-$  geldt

$$[P_1, \dots, P_n]^X \text{ normaalvorm van P} \Rightarrow F(P) = [f(P_1), \dots, f(P_n)]^X.$$

Def.23.  $(v_1, \dots, v_s)$  heet het type van M. Het symbool  $S_1^{v_1} \dots S_s^{v_s}$  heet de spectral manifold van M (volgorde irrelevant).

Def.24. Laat S een (niet noodzakelijk samenhangende) complex manifold zijn. We definiëren nu het (niet noodzakelijk samenhangend) MM dat door S wordt voorgebracht, en dat door  $M(S)$  wordt aangegeven.

Beschouw een collectie  $\{K_{\sigma}\}$  ( $\sigma \in \Sigma$ ) van open verzamelingen op S, zodanig dat elke  $K_{\sigma}$  conform in het z-vlak kan worden afgebeeld, en zó dat elk n-tal punten van S in minstens een  $K_{\sigma}$  is bevat. (De existentie van deze  $K_{\sigma}$ 's blijkt als volgt: Zijn  $\omega_1, \dots, \omega_n$  disjuncte gebieden van S, die alle op begrensde gebieden van het z-vlak conform kunnen worden afgebeeld, dan kan hun vereniging conform op een stel disjuncte gebieden worden afgebeeld). Bij elke  $K_{\sigma}$  is een conforme afbeelding  $\varphi_{\sigma}$  gekozen;  $\varphi_{\sigma}(K_{\sigma}) = L_{\sigma}$ . De inverse afbeelding heet  $\eta_{\sigma}$ . Zij  $\mathcal{K}_{\sigma}$  de verzameling van alle matrices waarvan het spectrum tot  $L_{\sigma}$  behoort.  $\mathcal{K}_{\sigma}$  valt uiteen in samenhangende componenten.  $\mathcal{K}_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{K}_{\sigma}^{(2)}, \dots$

Beschouw nu alle paren  $(\mathcal{K}_{\sigma}^{(i)}, A)$  ( $\sigma \in \Sigma, A \in \mathcal{K}_{\sigma}^{(i)}$ ). We noemen  $(\mathcal{K}_{\sigma}^{(i)}, A)$  en  $(\mathcal{K}_{\tau}^{(j)}, B)$  equivalent als

$$1^{\circ} \quad \eta_{\sigma}(S(A)) \in (K_{\sigma} \cap K_{\tau}), \quad \eta_{\tau}(S(B)) \in (K_{\sigma} \cap K_{\tau})$$

2<sup>o</sup>  $B = F(A)$ , als F de matrixfunctie is die (vgl. St.5) met de scalarfunctie  $f(z) = \varphi_{\tau}(\eta_{\sigma}(z))$  correspondeert ( $f(z)$  is gedefinieerd in  $\varphi_{\sigma}(K_{\sigma} \cap K_{\tau})$ ).

Deze equivalentierelatie voldoet aan de eisen van St.15 (behalve 5<sup>o</sup>). Het resultaat is een niet-samenhangend MM, dat we



$M(S)$  noemen.

St.26.  $M(S)$  is onafhankelijk van de keuze der  $\omega$ 's.

St.27.  $M(S)$  valt uiteen in samenhangende componenten, elk corresponderende met een mogelijkheid om de componenten van  $S$  te waarderen met gehele getallen  $\nu \geq 0$  met som  $n$ .

Def.25.  $M(S_1^{\nu_1}, \dots, S_s^{\nu_s})$  is de component die met de aangegeven waardering correspondeert.

St.28. De spectral manifold van  $\{M(S_1^{\nu_1} \dots S_s^{\nu_s})\}^-$  is  $S_1^{\nu_1} \dots S_s^{\nu_s}$ .

St.29. Is  $M$  een MM,  $S_1^{\nu_1} \dots S_s^{\nu_s}$  het spectral manifold van  $M^-$ , en  $M_1$  het MM uit Def.24, dan is er een analytische afbeelding van  $M^-$  in  $M_1$ , zó dat origineel en beeld steeds equivalente normaalvormen hebben.

Is  $F$  analytisch in  $M$ , dan is  $F$  ook analytisch in het corresponderende gebied van  $M_1$ ; punten van  $M$  die op eenzelfde punt van  $M_1$  worden afgebeeld, hebben gelijke waarden van  $F$ .

St.30.  $A \in MR_n$ . Dan is er een omgeving  $O_1 \ni A$  zó dat voor elke samenhangende omgeving  $O$  ( $A \in O \subset O_1$ ) het spectrale oppervlak van  $O^-$  hetzelfde type heeft als  $A$ .

St.31. De afbeelding van st.29 kan tot een afbeelding van  $M$  in  $M_1$  worden voortgezet.

St.32. Zijn  $M_1$  en  $M_2$  beide MM's en is  $F$  een analytische afbeelding van  $M_1$  in  $M_2$ , dan correspondeert daarmee een analytische afbeelding  $f$  van  $S_1$  in  $S_2$  ( $S_i = SM$  van  $M_i$ ).  $F$  en  $f$  bepalen elkaar éénduidig.

St.33. Is  $F$  analytisch op  $M$ , en  $f$  de corresponderende functie op  $S$  ( $S$  het SM van  $f$ ), en zijn  $P_1, \dots, P_n$  de punten van  $S$  die met het punt  $P$  van  $M$  corresponderen, dan zijn  $f(P_1), \dots, f(P_n)$  de eigenwaarden van  $F(P)$ .

Def.26. Matrix bol =  $M(S^n)$ , als  $S$  de complexe bol voorstelt.

Def.27. Zij  $M$  een MM. Analytische afbeeldingen van  $M$  in de  $M(S^n)$  heten meromorfe functies op  $M$ .

St.34. Met elke meromorfe functie op  $M$  correspondeert éénéénduidig een meromorfe functie op zijn SM.

St.35. Is  $M$  een MM, en convergeert een rij functies  $f_k$  uniform in elk compact deel van de SM, dan convergeren de corresponderende functies  $F_k$  uniform in elk compact deel van  $M$ .